e a . H e e, f a e a e f ea de e d f e d ca f ed a c .[7] F e a e, a e f c ca age I d ea e, f e c de ce f da e e de ec ed b ed a c 3% a d f a de ec ed b f ac 5.6%.[2]

Ne e ag g da e c f a EBUS a d EUS a e de e de a f de . I EBUS-g ded a b c f a eed e a a , da b e a e a a e ed f f e de ca be a ed g a g a f, f e e a a e f e c de ed c ca ega e. N de a ed a g a f a e f g f e be be g , a d EBUS f a a e fa e ega- e a e f de ec g b ed a – de .[8] I c a , EUS f a a fa e ega e a e f 13% f e f e de a e ad g a f ca a ; f e e, f a e f g f e ab 23% a e f f e ed a a da e e . T f d ca e f a ed a c VATS f d be ed c e e ed a a ag- g be e ed be c e e g EBUS a e EBUS c b ed f EUS. (P ea e ee C f a e 6 f e c e e f EBUS/EUS.) C a a e d e f a e de a ed f a ed a c ffe a g ea e be f de a ed, a g ea e be f a a ed, a d e c c e d g f a EBUS EUS.[9 11] D c e a f a e a N2 d ea e a e f e f c e f ea e ec e da ; f e a f e c a a e a de a be d c e ed e ab e ge a e ec c ec e da ega d g b e e ec af e d c f e a .

4. MEDIASTINAL STAGING AT THE TIME OF LUNG RESECTION